

Geachte mevrouw

Bij u werden er CONDYLOMATA verwijderd

Wat is dat?

Condylomata zijn wratten op de geslachtsdelen rond de anus.

Ze worden overgedragen door seksueel contact.

Om verdere besmetting en uitbreiding te voorkomen, worden ze onder verdoving weggebrand, weggesneden of gelaserd.

Onmiddellijk na de ingreep

- De ingreep gebeurt onder algemene anesthesie en hierdoor kunt u soms even last hebben van keelpijn doordat een buisje tijdens de operatie door de anesthesist in de luchtpijp geplaatst werd.
- Soms bent u misselijk en moet u overgeven. Indien dit te erg wordt, kan via het infuus een antibraakmiddel gegeven worden.
- Het infuus zelf blijft aanwezig tot deze klachten verdwenen zijn en u voldoende water kunt drinken.
- De eerste uren na de ingreep kunt u wat last hebben van pijn ter hoogte van de operatiestreek en wat vaginaal bloedverlies.
- Het is ook mogelijk dat u zich even onwel voelt.

Nazorgen

- De dag zelf vermijdt u best zware inspanningen maar vanaf de volgende dag kan u al u activiteiten hervatten.
- U mag gebruik maken van maandverband afhankelijk van de uitgebreidheid van de behandeling.
- Met tampons zou u beter nog even wachten (ongeveer 1 week), vooral als er ook vaginale condylomata verwijderd werden.
- U mag ook baden.
- Van zodra de pijn het toelaat, mag u terug betrekkingen hebben.

Controleafspraak

Gelieve voor een controleafspraak te telefoneren naar het nummer 059 41 60 30.

Intussen zal ook uw huisarts schriftelijk van de ingreep verwittigd worden.

Pijnbestrijding

Indien nodig: 4 maal daags 1 co Dafalgan® forte (= 1 g) of Apranax®.

Lokaal Flamazine® of Flamigel® aanbrengen

Mogelijke problemen/alarmsignalen zijn

- bloeding
- meer dan 38,5°C temperatuur
- blijvende pijn ondanks voldoende inname pijnstillende medicatie.

Bij problemen na uw ontslag kunt u steeds telefoneren naar:

Dagziekenhuis chirurgie (tot 19.00u): ☎ 059 41 62 20 Na 19.00u → spoedgevallendienst: ☎ 059 41 40 80

Het ganse team wenst u een goede thuiskomst en een spoedig herstel!